



INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTKY S OPERAČNÍM VÝKONEM

LABIOPLASTIKA

Vážená paní,

následující text Vám poskytne informace, které prohloubí Vaše vědomosti o plánovaném výkonu. V následujícím textu budete informována o základních pojmech týkajících se operačního výkonu - labioplastika, který jste se rozhodla podstoupit. Před zákrokem obdržíte informační leták **POKYNY PRO PACIENTKY**. Prosím, řiďte se pokyny uvedenými na letáku.

Operační postup

Alternativa výkonu: tento výkon nemá alternativní zákrok.

Labioplastika je operační výkon umožňující zmenšení malých nebo velkých stydkých pysků, které bývají často zvětšené a asymetrické. Při atrofii (ztrátě objemu a elasticity) velkých stydkých pysků lze operací docílit jejich zvětšení. Před operací je nutno podstoupit kompletní interní a laboratorní vyšetření a vyšetření gynekologem. Pokud je vše v pořádku, můžete podstoupit operaci. Minimálně měsíc před operací není dovoleno užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, které snižují srážlivost krve a dále léky na roztažení cév (vazodilatancia). Před operací byste neměla trpět žádnou virovou nebo jinou chorobou, neměla byste menstruovat, kojit ani být brzy po porodu.

Operace se provádí na operačním stole v tzv. gynekologické poloze. Operace trvá zhruba jednu hodinu a pro pacientku není nijak extrémně náročná. Operátor nejdříve desinfikuje a zarouškuje operovanou krajinu a poté si smyvateľnou netoxickou fixou předkreslí tvar řezu. Před výkonem si také může operátor pořídit fotodokumentaci.

Komplikace operace

Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi řídké. Komplikací popisovaných po této operaci není mnoho, jelikož poranění této krajiny je fyziologické – dochází k němu u každé ženy při porodu. Velmi vzácně se vyskytují všeobecné komplikace chirurgických výkonů, jako jsou trombosy (vznik krevní sraženiny v cévě), embolie (uzávěr cévy například z uvolněné krevní sraženiny), poranění sousedních cév, nervů či orgánů. Vzácně může dojít k většímu krvácení, zánětu, otoku nebo bolesti, kterým lze většinou předejít poctivým dodržováním pooperační péče. Jako pozdní komplikace se mohou vyskytnout tvarové odchylky, které lze odstranit nebo upravit malými korekčními výkony. Je však nutné si uvědomit, že ani při největší snaze operátora nelze vždy dosáhnout absolutní symetrie operované oblasti. Další pozdní komplikací mohou být poruchy citlivosti, které však většinou nejsou příliš výrazné. Mohou vymizet po delší době, nebo si pacientka zvykne. Další komplikace mohou nastat v souvislosti s narkózou, o čemž Vás informuje anesteziolog.



Pooperační režim

Po labioplastice se doporučuje minimálně po dobu jednoho týdne zvýšená hygiena operované oblasti (nejlépe sprcha 3x denně), dále používání obkladů, které se obměňují minimálně po 3 hodinách a po každé toaletě (močení a stolice). Neodporčuje se dlouhé sezení včetně dlouhých jízd autem. První měsíc, před úplným zhojením, se nedoporučuje užívání tamponů, vaginálních čípků a pohlavní styk.

Vážená paní,

naše stručná informace nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu zajímá.

Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro to, aby Vaše operace proběhla bez komplikací.

Jméno pacientky: _____

Rodné číslo: _____

Vysvětlující pohovor provedl:

Podpisem tohoto dokumentu prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod operace, způsob jejího provedení a byla jsem obeznámena s možnými komplikacemi. Informacím rozumím, jsem si vědoma možných komplikací a další dotazy nemám. Souhlasím s plánovaným operačním výkonem.

V _____ dne _____ Podpis pacientky: _____